



# Biopharma بيوفارما

شركة الإنتاج البيولوجية والصيدلانية البيطرية  
SOCIETE DE PRODUCTIONS BIOLOGIQUES  
ET PHARMACEUTIQUES VETERINAIRES

Km 2, route de Casablanca B.P. 4569 - Rabat - Akkari  
Tél. : 00212 5 37 69 16 92 • Fax : 00212 5 37 69 16 89  
e-mail : info@biopharma.ma

## BIOBURSA

Vaccin à virus vivant lyophilisé contre  
la bursite infectieuse aviaire  
1000 DOSES

### COMPOSITION : par dose vaccinale

Virus vivant atténué de la bursite infectieuse aviaire, souche intermédiaire «Lukert» Min  $10^{3.5}$  Max  $10^{5.5}$  DIO<sub>50</sub>

### INDICATION :

Immunisation active du poulet, poules pondeuses, futures pondeuses et reproductrices contre la bursite infectieuse aviaire.

### MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE :

- Voie orale par incorporation dans l'eau de boisson :

Pour remettre en solution le vaccin, ouvrir l'ampoule sous l'eau et reconstituer entièrement le vaccin. Veillez à rincer deux fois le flacon et le bouchon et de récupérer tout le contenu.

Il est conseillé d'ajouter à l'eau de boisson destinée pour la reconstitution du vaccin, du lait écrémé à raison de 2 à 4%.

Reconstituer le vaccin avec de l'eau **froide propre non chlorée et non ferrugineuse** dans une quantité prévue pour une consommation dans une ou deux heures maximum qui suivent la préparation.

Distribuer la solution vaccinale préparée juste après reconstitution à des oiseaux préalablement privés d'eau pendant 2 heures pour une absorption de la suspension vaccinale dans les deux heures qui suivent.

### PROGRAMME DE VACCINATION :

Le vaccin BIOBURSA peut être utilisé en primo vaccination à partir du 7<sup>ème</sup> jour d'âge.

Le programme vaccination dépend du taux des anticorps d'origine maternelle.

- Niveau bas ou pas d'anticorps maternels : vaccination à 7 jours d'âge.
- Niveau d'anticorps élevé : vaccination après évaluation du taux moyen d'anticorps pour éviter la neutralisation du virus vaccinal. Une vaccination rappel au 21<sup>ème</sup> jour d'âge après la primo vaccination est recommandée pour stimuler l'immunité du fait que le taux des anticorps maternels chute significativement à cet âge.
- Niveau d'anticorps hétérogène : vaccination au 7<sup>ème</sup> jour d'âge puis vaccination rappel 7 jours après.

### PRECAUTIONS :

#### Précautions d'emploi chez l'animal :

Ne pas utiliser du matériel stérilisé par des produits chimiques.

Ne vacciner que les sujets en bonne santé.

Utiliser de l'eau froide propre contenant peu de chlore et peu d'ions pour la dissolution.

Utilisation immédiate après reconstitution.

#### Précautions d'emploi à prendre par la personne chargée de la vaccination :

Le virus de la Bursite infectieuse ne s'avère pas présenter un risque pour la santé humaine. Cependant laver et désinfecter les mains et les équipements après vaccination.

### CONTRE-INDICATIONS ET EFFETS INDESIRABLES :

Les animaux malades doivent être exclus de la vaccination.

Eviter de vacciner pendant la période de ponte.

**DELAÏ D'ATTENTE :** Zéro jour.

### PRESENTATION :

Flacon de 1000 doses de vaccin lyophilisé.

### CONSERVATION :

Entre +2°C et + 8°C à l'obscurité.

Ne pas congeler.



**USAGE VETERINAIRE A NE DELIVRER QUE SUR ORDONNANCE**