



CAMEL POX VACCINE

VACCIN INACTIVÉ ADJUVÉ À L'HYDROXYDE D'ALUMINIUM POUR LA PRÉVENTION DE LA VARIOLE DU DROMADAIRE.

SUSPENSION INJECTABLE

COMPOSITION

CHAQUE DOSE VACCINALE DE 05 ML CONTIENT:

PRINCIPE ACTIF :

virus inactivé de la variole du dromadaire (Orthopoxvirus), souche "Laâyouné 84"..... $\geq 10^{6,8}$ DICT₅₀ avant inactivation.

EXCIPIENTS :

ADJUVANT : Aluminium sous forme hydroxyde :.....Max 2,6 mg/ml \pm 0,8.

INDICATIONS

Prévention par immunisation active contre la variole du dromadaire.

CONTRE-INDICATIONS

Les animaux malades et non vermifugés doivent être exclus de la vaccination

MISES EN GARDE PARTICULIÈRES À CHAQUE ESPÈCE CIBLE

Aucune.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'EMPLOI CHEZ L'ANIMAL

- Respecter les conditions habituelles d'asepsie et éviter tout traumatisme intempestif.
- Utiliser pour l'injection du matériel stérile dépourvu de toute trace d'antiseptique ou de désinfectant.
- Agiter vigoureusement le flacon avant emploi afin de remettre en suspension le précipité constitué par l'hydroxyde d'aluminium.
- Ne vacciner que les animaux en parfait état de santé.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES À PRENDRE PAR LA PERSONNE QUI ADMINISTRE LE MÉDICAMENT AUX ANIMAUX

En cas d'auto-injection accidentelle, prenez immédiatement conseil auprès de votre médecin en lui montrant la notice ou l'étiquette

AUTRES PRECAUTIONS

SO

EFFETS SECONDAIRES

La vaccination peut entraîner l'apparition d'un petit nodule transitoire au point d'injection qui disparaît en quelques jours.

UTILISATION EN CAS DE GRAVIDITE ET / OU DE LACTATION

Les études disponibles n'indiquent pas d'effet défavorable pour les femelles en gestation ou en lactation. Le vaccin peut être utilisé en toute sécurité sur les femelles gestantes à tout moment sans que cela puisse affecter leur état physiologique ou porter atteinte à la fonction de reproduction.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES FORMES D'INTERACTIONS

Aucune information n'est disponible sur l'innocuité et l'efficacité de l'association de ce vaccin avec un autre médicament vétérinaire. En conséquence, la décision d'utiliser ce vaccin avant ou après un autre médicament vétérinaire doit être prise au cas par cas.

MODE, VOIE (S) D'ADMINISTRATION ET POSOLOGIE

Une dose vaccinale de 5 ml quel que soit l'âge, le poids ou le stade physiologique de l'animal.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Injecter le vaccin par voie sous-cutanée ou intramusculaire à la base de l'encolure.

PROGRAMME DE VACCINATION

Première injection : A partir de 6 mois d'âge;

Deuxième injection : l'immunité est considérablement renforcée et prolongée par une 2ème injection pratiquée un mois plus tard.

Rappel : Au plus tard 1 an après la dernière vaccination

SURDOSAGE (SYMPTÔMES, CONDUITE D'URGENCE, ANTIDOTES) SI NÉCESSAIRE

Aucun effet indésirable autre que celui mentionné à la rubrique 'Effets indésirables' n'a été constaté après administration d'une double dose de vaccin.

TEMPS D'ATTENTE

Aucun délai d'attente n'est nécessaire (Zéro jour).

INCOMPATIBILITÉS

Aucune incompatibilité majeure n'a été identifiée.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Le vaccin se conserve pendant 24 mois dans son emballage commercial, à l'abri de la lumière et à température comprise entre + 2°C et + 8°C; ne pas congeler.

PRÉSENTATION (S):

Boîte isotherme de 10 flacons d'une dose de 5 ml.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES À PRENDRE LORS DE L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS NON UTILISÉS OU DE DÉCHETS DÉRIVÉS DE L'UTILISATION DE CES MÉDICAMENTS

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets pharmaceutiques



**USAGE VÉTÉRINAIRE.
A NE DÉLIVRER
QUE SUR ORDONNANCE.**

SOCIÉTÉ DE PRODUCTIONS BIOLOGIQUES ET PHARMACEUTIQUES - BIOPHARMA



Avenue HASSAN II, CYM - B.P.4569 - Rabat-Akkari. Maroc.



+212 537 693 632 | +212 537 691 689



+212 537 695 053 | +212 537 691 692



info@biopharma.ma



www.biopharma.ma