



# VACCIN INACTIVÉ ADJUVÉ À L'HYDROXYDE D'ALUMINIUM POUR LA PRÉVENTION DE LA RAGE ANIMALE.

## SUSPENSION INJECTABLE

### COMPOSITION

LE VACCIN "RABIVAC", RÉPOND À LA COMPOSITION SUIVANTE :  
CHAQUE 1 ML DE VACCIN CONTIENT :

#### PRINCIPE ACTIF :

Souche Pasteur (PV) du virus rabique inactivée titrant au minimum.....2 (deux) UI\*.

\* titres minimaux conformément aux exigences de la pharmacopée Européenne

#### EXCIPIENTS :

Aluminium (sous forme hydroxyde) au maximum 2,4 mg

### INDICATIONS

Immunisation active des Canins, félins, équins et ruminants contre la Rage.

### CONTRE-INDICATIONS

- Les animaux malades doivent être exclus de la vaccination.
- Eviter de vacciner les animaux soumis au stress (transport par exemple).

### MISES EN GARDE PARTICULIÈRES À CHAQUE ESPÈCE CIBLE

- Ne pas administrer le vaccin par voie sous cutanée chez les chevaux.

### PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'EMPLOI CHEZ L'ANIMAL

- Ne vacciner que les animaux en bonne santé.
- Il est recommandé de décaler le traitement vermifuge 10 jours avant la date de la vaccination antirabique.
- Éviter de stresser les animaux avant et après la vaccination.
- Tenir en compte la présence des anticorps d'origine maternelle chez les jeunes primo-vaccinés.

### PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES À PRENDRE PAR LA PERSONNE QUI ADMINISTRE LE MÉDICAMENT AUX ANIMAUX

- Il est recommandé de manipuler la suspension vaccinale avec précautions au lors injections et de laver et désinfecter les mains et les équipements après vaccination.
- En cas d'injection accidentelle, consulter un médecin et lui montrer la notice ou l'étiquette du produit.

### AUTRES PRECAUTIONS

Tous les flacons de vaccin non utilisés ou les déchets dérivés de ce médicament doivent être éliminés et détruits selon la réglementation en vigueur dans le pays.

RABIVAC

## EFFETS SECONDAIRES

La présence d'hydroxyde d'aluminium peut parfois entraîner l'apparition d'un petit nodule transitoire au point d'inoculation. La vaccination peut, très rarement, provoquer des réactions d'hypersensibilité. Instaurer, alors, un traitement symptomatique.

## UTILISATION EN CAS DE GRAVIDITE ET / OU DE LACTATION

Le vaccin peut être utilisé chez les femelles gestantes et en période de lactation.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES FORMES D'INTERACTIONS :

Aucune information n'est disponible sur l'innocuité et l'efficacité du vaccin lorsqu'il est associé avec un autre médicament vétérinaire. En conséquence, la décision de l'utiliser avant ou après un autre médicament vétérinaire doit être prise au cas par cas.

## MODE, VOIE (S) D'ADMINISTRATION ET POSOLOGIE

### POSOLOGIE

- Chien et chat : 1 ml ;
- Ovins et caprins : 1 ml ;
- Bovins et équins : 2 ml

### VOIE D'ADMINISTRATION

sous-cutanée (chevaux exclus) ou intramusculaire.

### MODE D'ADMINISTRATION

- Utiliser pour la vaccination du matériel stérile, dépourvu de toute trace d'antiseptique ;
- Avant emploi, homogénéiser la suspension vaccinale par agitation douce du flacon, tout en évitant la formation de bulles, afin de remettre en suspension le précipité blanc constitué par l'hydroxyde d'aluminium ;
- Eviter la formation de bulles lors de l'agitation et au moment de l'injection, car la présence de bulles d'air peut entraîner une irritation au niveau du site d'injection ;
- Respecter les consignes d'asepsie usuelles ;
- Vérifier régulièrement le volume injecté ;
- Eviter les ponctions répétitives du flacon et utiliser tout le contenu du flacon après ouverture.

### PROGRAMME DE VACCINATION

#### **Carnivores :**

- ▶ **Issus de mères non vaccinées:** 04 semaines
- ▶ **Issus de mères vaccinées:** Primo vaccination à partir de l'âge de 12 semaines. Si la vaccination est opérée avant 12 semaines, le calendrier de vaccination devrait être complété par une administration d'une dose vaccinale à l'âge de 12 semaines ou quelques semaines plus tard.

#### **Herbivores :**

- ▶ **Issus de mères non vaccinées:** 04 mois. Si la vaccination a été pratiquée avant les 4 mois d'âge, une administration d'une dose vaccinale à l'âge de 4 mois ou plus tard doit être réalisée pour compléter le calendrier de vaccination
- ▶ **Issus de mères vaccinées :** 09 mois.

- **Rappel** : une injection annuelle.

## SURDOSAGE (SYMPTÔMES, CONDUITE D'URGENCE, ANTIDOTES) SI NÉCESSAIRE

A part les effets secondaires notifiés dans la section « effets secondaires », aucun effet indésirable n'a été constaté après administration de deux fois la dose du vaccin.

## TEMPS D'ATTENTE

Zéro jour (Nul).

## INCOMPATIBILITÉS

Ne pas mélanger le vaccin **RABIVAC** avec d'autres vaccins ou d'autres produits médicamenteux.

## PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Conserver et transporter à une température comprise entre +2°C et +8°C, à l'abri de la lumière. Ne pas congeler.

## PRÉSENTATION (S):

- Flacon de 10 ml pour 10 doses
- Flacon de 05 ml pour 05 doses
- Flacon de 01 ml pour 01 dose
- Boite de 10 flacons de 01 dose
- Boite de 10 flacons de 05 doses
- Boite de 10 flacons de 10 doses

## PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES À PRENDRE LORS DE L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS NON UTILISÉS OU DE DÉCHETS DÉRIVÉS DE L'UTILISATION DE CES MÉDICAMENTS

Tous les flacons de vaccin non utilisés ou les déchets dérivés de ce médicament doivent être éliminés et détruits selon la réglementation en vigueur dans le pays.



**USAGE VÉTÉRINAIRE.  
A NE DÉLIVRER  
QUE SUR ORDONNANCE.**

SOCIÉTÉ DE PRODUCTIONS BIOLOGIQUES ET PHARMACEUTIQUES - **BIOPHARMA**



Avenue HASSAN II, CYM - B.P.4569 - Rabat-Akkari. Maroc.



+212 537 693 632 | +212 537 691 689



+212 537 695 053 | +212 537 691 692



info@biopharma.ma



www.biopharma.ma